

# Stereotaksi - Vævsprøvetagning i brystet

Til patienter og pårørende

## Prøvetagning og indsættelse af titaniumclips

På dine røntgenbilleder er der fundet nogle forandringer, som ikke kan føles. Disse forandringer ønskes undersøgt nærmere for at afklare, om der er tale om et forstadium til kræft.

Prøvetagningen af væv er skånsom, da den udføres i lokalbedøvelse og kun efterlader et ganske lille ar.

Vævsprøvetagningen foregår i Røntgen og Skanning og foretages af en læge.

Undersøgelsen tager ca. 1 time.

Det er vigtigt for behandlingens gennemførelse, at du er i stand til at ligge stille på siden i ca. 1 time.

Hvis du gerne vil høre musik under prøvetagningen, er du velkommen til at medbringe en MP3-afspiller eller lignende.

### Før undersøgelsen

Tager du Magnyl, skal du ophøre med dette 5 dage før behandlingen.


Tager du anden blodfortyndende medicin skal du kontakte mammografien tlf. **7997 3630**, så kan vi lægge en plan for din blodfortyndende behandling.

Du skal ikke være fastende til undersøgelsen.

### Undersøgelsens forløb

Undersøgelsen starter med en grundig information, således at du er fuldt orienteret om, hvad der skal ske.

Derefter vil personalet lægge dig rigtig godt tilrette på lejet.



Mammografi billeder

Brystet bliver klemt fast, som du har prøvet i mammografiapparatet. Trykket er dog ikke helt så hårdt.

Der vil blive taget nogle røntgenbilleder, så man kan sikre sig, at forandringerne er med.

Ved hjælp af en computer kan den præcise beliggenhed beregnes.

Lægen lægger en lokalbedøvelse, og når den virker, bliver der lavet et lille snit (5-6 mm) i huden og forsigtigt ført en prøvetagningsnål ind i området med forandringer.

Når denne er korrekt placeret, tages prøverne.

Der suges ca. 6 prøver ud fra området.

Afslutningsvis vil der blive lagt en lille titaniumclips ind i området, således at man efterfølgende vil kunne genfinde området på almindelige mammografibilleder.

Når nålen er fjernet, trykker vi på brystet for at forhindre en eventuel blødning.

Der vil under hele undersøgelsesforløbet være en røntgensygeplejerske (radiograf), der udelukkende koncentrerer sig om dit velbefindende.

# Stereotaksi - Vævsprøvetagning i brystet

Efter undersøgelsen Du får et plaster over det sted, hvor vævsprøverne er taget. Plastret fjernes efter 48 timer. Det sker i sjældne tilfælde, at der kommer en blødning fra det sted, hvor prøverne er taget.

Vi anbefaler, at du holder dig i ro i 4 timer efter undersøgelsen og at du ikke laver hårdt fysisk arbejde de næste 48 timer.

Du kan få et blå mærke, hvor prøverne er taget, men det forsvinder igen.

Når lokalbedøvelsen er ophørt med at virke, kan der komme nogle smerter i brystet.

Almindelige smertestillende tabletter (evt. Panodil) vil kunne afhjælpe disse.

Skulle du senere få andre komplikationer (blødning, feber, stærke smerter eller lignende), skal du kontakte din egen læge eller vagtlæge

## Svar på prøverne (biopsierne)

Du får en svartid i E-boks.

Der kan gå op til 11 hverdage, inden prøverne er undersøgt.

Svaret vil blive givet i Kirurgisk Ambulatorium af en kirurgisk overlæge enten i Vejle eller i Esbjerg.

## Ændre tid/melde afbud:

<https://sygehussonderjylland.dk/>

Du er altid velkommen til at kontakte os

## Røntgen og Skanning Aabenraa:

Tlf.: 79 97 51 00