

Undersøgelse for kræft eller betændelse i kroppen

Forberedelse til undersøgelsen

Faste

- Du må ikke spise eller drikke andet end vand i 6 timer op til skanningen. Heller ikke pastiller, bolsjer eller tyggegummi. (ej helle sukkerfrit) i faste perioden.

Medicin

- Du skal tage din vanlige medicin på skanningsdagen.
- Har du brug for smertestillende medicin for at kunne ligge stille, skal du tage dette.
- Har du klaustrofobi og brug for beroligende medicin, skal du kontakte den læge, der har henvist dig.

- Du skal undgå fysisk aktivitet som f.eks. cykling på undersøgelsesdagen.
- Du må ikke bære smykker, hårspænder, ur og undertøj med metaldele, når du kommer til skanningen.

Diabetes

Du skal faste 6 timer før skanningen som angivet ovenfor i afsnittet Faste

- Er du i behandling med insulin, så skal du spise et normalt måltid og samtidig tage din sædvanlige insulindosis 4 timer inden skanningen, herefter skal du faste i 4 timer.
- Er du i behandling med metformin, skal du holde en pause med metformin i 48 timer op til skanningen.
- Ved indkaldelse til skanning mindre end 48 timer før undersøgelsen, skal du holde pause med metformin så længe som muligt før skanningen.

Kemoterapi

Hvis du er i behandling med kemoterapi, skal der være gået mindst 13 dage siden opstart af sidste kur, med mindre andet er aftalt.

Er du i tvivl, så kontakt os.

Dialyse

Hvis du skal i dialyse umiddelbart før undersøgelsen, skal du kontakte os.

Undersøgelsen

Du får en indsprøjtning med et radioaktivt sporstof i armen. herefter hviler du i 60 min. inden skanningen. Du skal ligge helt stille under skanningen (ca. 20 minutter). Du vil evt. få en indsprøjtning med et røntgen kontrastmiddel. Efter undersøgelsen har vi desværre ikke mulighed for at tilbyde mad, så vi beder dig om selv at medbringe mad til efter undersøgelsen.

Varighed

Hele undersøgelsen varer ca. 2-3 timer

Stråledosis

Det indsprøjtede sporstof samt CT skanningen giver en stråledosis til kroppen, der er større end man får ved en almindelig røntgenundersøgelse. Stråledosis er ca. 3-4 gange højere end den almindelige årlige baggrundsstråling i Danmark (3 mSv)

Svar

Du får svar på undersøgelsen af den læge eller afdeling, der har henvist dig.

Kan du svare JA til et af følgende spørgsmål bedes du kontakte os på telefon: 79 97 51 00

- hvis du ikke kan ligge stille og fladt på ryggen i op til 1,5 timer
- er gravid eller ammende
- kommer med liggende transport

Vedlagte spørgeskema kan udleveres og udfyldes ved ankomst til PET Centeret.

Venlig hilsen **Røntgen og Skanning, Aabenraa**